



ficha administración parenteral

Ceftriaxona 1 gr	
Lab DFM/F-23170	
uso restringido	NO
reconstitución	Vía im en 3,5 ml de lidocaína 1,06%. Vía ev en 10 ml api
dilución	sí, con sf, sg5%
estabilidad	La solución reconstituida mantiene su estabilidad física y química durante 6 horas a 25°C, o 24 horas entre 2-8°C.
administración parenteral	IM: sí, reconstituir en 10 ml de api e infundir en 5 minutos
	EV bolo: no
	EV infusión intermitente: sí. Reconstituir 1 gr en 10 ml de api y completar 20 ml agregando 10 ml de sg5%, sf, administrar en 30 minutos. Reconstituir 2 gr en 15 ml de api y completar 25 ml agregando 10 ml de sg5%, sf, administrar en 30 minutos.
EV infusión continua: no	
obs / compatibilidad	La solución reconstituida debe agitarse durante 60 segundos para asegurar la completa dilución de la ceftriaxona. La ceftriaxona no debe mezclarse con soluciones que tengan que contienen calcio, ni administrarse simultáneamente.
Medicamento con riesgo de extravasación	SÍ
Medicamento de alto riesgo	NO

Referencia:

Folleto de Información al paciente de Ceftriaxona 1 gr Lab DFM/F-23170.

QF. Claudia Díaz Soto