



## ficha administración parenteral

|   |   |
|---|---|
| Ceftriaxona 1 gr                        |   |
| Lab. Fresenius-Kabi/F-18545             |   |
| uso restringido                         | NO  |
| reconstitución                          | sí, con 2,5-3,5 ml de lidocaína 1% para vía im, o en 10 ml de api, sf, sg5 % para vía ev  |
| dilución                                | sí, con sf, sg5%  |
| estabilidad                             | Reconstituido de 100 mg/ml en api, sf o sg5% es estable por 72 horas refrigerado o 24 horas a 25 °C. Diluido en 25 ml de sf, sg5% es estable por 72 horas refrigerado o 24 horas a 25 °C. |
| administración parenteral               | IM: reconstruir con 3,5-2,5 ml de lidocaína 1%  |
|   | EV bolo: reconstituir en 10 ml de api y administrar en 2-4 minutos  |
|   | EV infusión intermitente: una vez reconstituido en 10 ml de api, diluir con 25-100 ml de sf, sg5% y administrar en 30 minutos   |
|   | EV infusión continua: no  |
| obs / compatibilidad                    | La ceftriaxona no debe mezclarse con soluciones que tengan que contienen calcio, ni administrarse simultáneamente.  |
| Medicamento con riesgo de extravasación | SÍ  |
| Medicamento de alto riesgo              | NO  |

Referencias:

Folleto de Información al paciente de Ceftriaxona 1 gr de Lab. Fresenius-Kabi/F-18545.

Consultas por correo electrónico a Dirección técnica de Lab. Fresenius-Kabi.

QF. Claudia Díaz Soto