



Ficha administración parenteral

Nombre genérico Ampicilina 1g/ Sulbactam 500 mg	
Lab. Pfizer / F-4436	
Uso restringido	SI
Reconstitución	Si, 1,5 gr en 3,2 mL de api, sf, sg 5%, sg 10% o Ringer lactato.
Dilución	30 mL de Agua para inyectables (en período de administración 8 hrs) o 30 mL Cloruro de sodio isotónico (en período de administración 8 hrs) o 50 a 100 ml de 5% glucosa (dextrosa) (en período de administración 2 hrs) o 500 ml de 10% de azúcar glucosa (dextrosa) invertido en agua (en período de administración 4 hrs) o 30 mL Solución Ringer lactato(en período de administración 8 hrs).
Estabilidad	La solución concentrada para administración intramuscular debe utilizarse dentro de 1 hora desde la reconstitución
Administración parenteral	IM: profunda, puede reconstituirse 3,2 ml de api o de lidocaína 0,5% si se presenta dolor.
	EV bolo: sí, administrar 1,5 gramos de la solución reconstituida en un volumen total de 6 a 12 ml de sf, sg 5%, sg 10% o Ringer lactato. Administrar en un tiempo de 3 minutos.
	EV infusión intermitente: 1,5 gramos de la solución reconstituida en un volumen total de 75-150 ml de sf, sg 5%, sg 10% o Ringer lactato.
	EV infusión continua: no indicado por fabricante
Obs. / compatibilidad	No administrar en pacientes sensibles a penicilinas Dosis máxima de sulbactam 4 gr diarios No mezclar con productos sanguíneos, proteínas hidrolizadas y es incompatible con aminoglicósidos
Medicamento con riesgo de extravasación	SI
Medicamento de alto riesgo	NO

QF. Paulina Parada

Referencia:

Proyecto Anidulafungina 100 mg (Ecalta) Pfizer / F-24802, consultado 16 abril 2021

Respuesta Laboratorio Pfizer 29 abril 2021.