



ficha administración parenteral

Cefotaxima 1 gr	
Lab. DFM/Reg ISP N° F-24870	
uso restringido	sí
reconstitución	sí. Para vía im reconstituir en 4 ml de api, y vía ev reconstituir en 10 ml de api
dilución	sí con sf, sg5%
estabilidad	La solución reconstituida con api y diluido con sf o sg5% es estable 24 horas almacenado entre 2 y 8 °C
administración parenteral	IM: sí, previa dilución en 4 ml de api con lidocaína al 1%.
	EV bolo: sí, reconstituir y diluir en un total de 10 ml de api. Administrar en 3 a 5 minutos. No debe ser administrada por un periodo menor a 3 minutos.
	EV infusión intermitente: sí. Una vez reconstituido llevar 1-2 gramos a 20 o 40 ml de api, sf, o sg5%, respectivamente. O, 1-2 gramos de cefotaxima en 50-100 ml, de sf, sg5%, administrando en 50-60 minutos.
	EV infusión continua: no
obs / compatibilidad	Las soluciones recién preparadas pueden tener una coloración ligeramente amarilla que no influye en la actividad del antibiótico. Nunca deben administrarse soluciones de color amarillo pardo o marrón. No deberá utilizarse solución de Bicarbonato sódico.
Medicamento con riesgo de extravasación	Sí
Medicamento de alto riesgo	NO

QF. Claudia Díaz Soto

Referencias:

Folleto de información al profesional.

Respuesta del ISP de consulta 21-125 al 21-127