



<b>Ficha administración parenteral</b>	
<b>Nombre genérico</b> Co-Trimoxazol 400/800	
<b>Laboratorio titular registro / registro ISP</b> Unifarma / F-22306	
<b>Uso restringido</b>	SI
<b>Reconstitución</b>	Glucosa al 5 o 10% Dextrano 6% en glucosa 5% Solución Ringer (USP) cloruro de sodio 0.9% cloruro de Sodio 0.18% + glucosa 4%
<b>Dilución</b>	1 ampolla (5 mL) en 125 mL solución 2 ampollas (10 mL) en 250 mL de suero 3 ampollas (15mL) en 500 mL de solución
<b>Estabilidad</b>	6 horas luego de preparado a temperatura ambiente
<b>Administración parenteral</b>	<b>IM:</b> No indica
	<b>EV bolo:</b> No indica
	<b>EV infusión intermitente:</b> No exceder la hora y media. La duración normal es de 30-60 minutos.
	<b>EV infusión continua:</b> No indica
<b>Obs. / compatibilidad</b>	<p>Administración por perfusión lenta. No debe ser inyectado directamente por vena, sólo puede ser usado luego de diluirse.</p> <p>Si presenta partículas o turbidez, no utilizar.</p> <p>La soluciones deben prepararse inmediatamente previo a uso y administradas dentro de las 6 horas a temperatura ambiente y con luz difusa.</p> <p>No mezclar con otros medicamentos.</p> <p>Clearance de creatinina &gt; 30mL/min: posología estándar 15-30mL/min: mitad de posología estándar &lt;150mL/min: No se aconseja uso</p>

QF. Paulina Parada

## REFERENCIAS

Prospecto Co-trimoxazol 400/800 Unifarma / F-22306, consultado 15 abril 2021