



ficha administración parenteral

Omeprazol 40 mg (Pentren)	
Lab. PISA/ Reg. ISP N° F-22755/16	
uso restringido	no
reconstitución	SÍ, SOLO CON SOLVENTE COMPUESTO POR ÁCIDO CITRICO+PEG400+API. SOLO PARA ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	SÍ, CON SF O SG5 % SOLO CUANDO SEA PARA ADMINISTRAR EN INFUSIÓN
dilución	Sí, con sf o sg5%
estabilidad	4 horas una vez reconstituido con solvente indicado. 12 horas una vez diluido con sf o 6 horas una vez diluido con sg 5%
administración parenteral	IM: no
	EV bolo: sí, solución reconstituida en 10 ml del solvente indicado se debe administrar en 2,5 ml (administrar 4 ml por minuto)
	EV infusión intermitente: sí, la solución reconstituida en solvente indicado se puede diluir en 100 ml de sf, o sg 5%. Administrar de forma lenta e un periodo de tiempo de 20 a 30 minutos a una velocidad de 3 a 5 ml por minuto.
	EV infusión continua: sí. Si es diluido con sf se puede administrar en un máximo de 12 horas después de la reconstitución, mientras que si es sg5% se debe administrar en un máximo de 6 horas después de la reconstitución.
obs / compatibilidad	No debe utilizarse si se observan partículas en la solución reconstituida. No mezclar con otros medicamentos en la misma solución.

Referencias:

Folleto de información al profesional Omeprazol 40 mg FA Lab. PISA/ Reg. ISP N° F-22755/16

Consulta a ISP el 15/09/2021

QF. Claudia Díaz Soto